

SEINÄJOEN SEUDUN ILMANLAADUN MITTAUSTEN KUUKAUSIRAPORTTI

TAMMIKUU 2026

YHTEENVETO SEINÄJOEN VAPAUDENTIELLÄ SIJAITSEVAN ILMANLAADUN MITTAUSASEMAN MITTAUSTULOKSISTA

Tammikuussa Seinäjoen Vapaudentien mittausasemalla tehtyjen hengitettävien hiukkasten (PM10) ja typenoksidien (NO_x) mittausten mukaan ilmanlaatu oli mitatusta ajasta vaihtelevaa, mutta kuitenkin pääosin hyvää.

Ilmanlaatua kuvaava ilmanlaatuindeksi oli mitatusta ajasta 82,8 % hyvä, 13,2 % tyydyttävä, 3,7 % välttävä ja 0,3 % huono.

RAJA- JA OHJEARVOVERTAILUT

Mitatuissa pitoisuuksissa ei havaittu raja- tai ohjearvon ylityksiä.

Hengitettävät hiukkaset, PM10


Mittausten ajallinen kattavuus oli 99,5 %.

Tuntipitoisuuden keskiarvo oli 7,6 µg/m³. Huipputuntipitoisuus oli 110,3 µg/m³. 2. suurin vuorokausiarvo oli 18,2 µg/m³, joka on 26,0 % ohjearvosta (70 µg/m³).


Vuorokausiarvo ei ylittänyt kuun aikana EU:n raja-arvon lukuarvoa (50 µg/m³).

Hengitettävien hiukkasten osalta ilmanlaatuindeksi oli mitatusta ajasta 93,5 % hyvä, 5,7 % tyydyttävä, 0,5 % välttävä ja 0,3 % huono.





Kuva 1. Hengitettävien hiukkasten tuntipitoisuus tammikuussa 2026.




Kuva 2. Hengitettävien hiukkasten vuorokausipitoisuus tammikuussa 2026.

Typpidioksidi, NO₂


Mittausten ajallinen kattavuus oli 99,5 %.

2. suurin vuorokausiarvo oli 42,2 µg/m³, joka on 60,3 % ohjearvosta (70 µg/m³).
Huipputuntipitoisuus oli 98,7 µg/m³. Tuntiohjearvoon verrattava 99 %-pisteen arvo on 76,4 µg/m³, joka on 50,9 % ohjearvosta (150 µg/m³).

Typpidioksidin osalta ilmanlaatuindeksi oli mitatusta ajasta 86,4 % hyvä, 10,5 % tyydyttävä ja 3,1 % välttävä.



Kuva 3. Typpidioksidin tuntipitoisuus tammikuussa 2026.



Kuva 4. Typpidioksidin vuorokausipitoisuus tammikuussa 2026.

Laatinut/lisätiedot:

Jukka Järvinen
ympäristönsuojelutarkastaja
Seinäjoen kaupunki
jukka.jarvinen@seinajoki.fi

