

SEINÄJOEN SEUDUN ILMANLAADUN MITTAUSTEN KUUKAUSIRAPORTTI

KESÄKUU 2026

YHTEENVETO SEINÄJOEN VAPAUDENTIELLÄ SIJAITSEVAN ILMANLAADUN MITTAUSASEMAN MITTAUSTULOKSISTA

Kesäkuussa Seinäjoen Vapaudentien mittausasemalla tehtyjen hengitettävien hiukkasten (PM10) ja typenoksidien (NOx) mittausten mukaan ilmanlaatu oli mitatusta ajasta lähes kokonaan hyvää.

Ilmanlaatua kuvaava ilmanlaatuindeksi oli mitatusta ajasta 96,1 % hyvä ja 3,9 % tyydyttävä.

RAJA- JA OHJEARVOVERTAILUT

Mitatuissa pitoisuuksissa ei havaittu raja- tai ohjearvojen ylityksiä.

Hengitettävät hiukkaset, PM10


Mittausten ajallinen kattavuus oli 99,6 %.

Tuntipitoisuuden keskiarvo oli 10,3 µg/m³. Huipputuntipitoisuus oli 45,6 µg/m³.
2. suurin vuorokausiarvo oli 18,7 µg/m³, joka on 26,7 % ohjearvosta (70 µg/m³).


Vuorokausiarvo ei ylittänyt kuun aikana EU:n raja-arvon lukuarvoa (50 µg/m³).

Hengitettävien hiukkasten osalta ilmanlaatuindeksi oli mitatusta ajasta 96,2 % hyvä ja 3,8 % tyydyttävä.





Kuva 1. Hengitettävien hiukkasten tuntipitoisuus kesäkuussa 2026.




Kuva 2. Hengitettävien hiukkasten vuorokausipitoisuus kesäkuussa 2026.

Typpidioksidi, NO₂


Mittausten ajallinen kattavuus oli 99,6 %.

2. suurin vuorokausiarvo oli 6,9 µg/m³, joka on 9,9 % ohjearvosta (70 µg/m³).
Huipputuntipitoisuus oli 41,7 µg/m³. Tuntiohjearvoon verrattava 99 %-pisteen arvo on 12,5 µg/m³, joka on 8,3 % ohjearvosta (150 µg/m³).

Typpidioksidin osalta ilmanlaatuindeksi oli mitatusta ajasta 99,9 % hyvä ja 0,1 % tyydyttävä.



Kuva 3. Typpidioksidin tuntipitoisuus kesäkuussa 2026.



Kuva 4. Typpidioksidin vuorokausipitoisuus kesäkuussa 2026.

Laatinut/lisätiedot:

Jukka Järvinen
ympäristönsuojelutarkastaja
Seinäjoen kaupunki
jukka.jarvinen@seinajoki.fi

