

SEINÄJOEN SEUDUN ILMANLAADUN MITTAUSTEN KUUKAUSIRAPORTTI

HEINÄKUU 2026

YHTEENVETO SEINÄJOEN VAPAUDENTIELLÄ SIJAITSEVAN ILMANLAADUN MITTAUSASEMAN MITTAUSTULOKSISTA

Heinäkuussa Seinäjoen Vapaudentien mittausasemalla tehtyjen hengitettävien hiukkasten (PM10) ja typenoksidien (NO_x) mittausten mukaan ilmanlaatu oli mitatusta ajasta lähes kokonaan hyvää.

Ilmanlaatua kuvaava ilmanlaatuindeksi oli mitatusta ajasta 95,7 % hyvä ja 4,3 % tyydyttävä.

RAJA- JA OHJEARVOVERTAILUT

Mitatuissa pitoisuuksissa ei havaittu raja- tai ohjearvojen ylityksiä.

Hengitettävät hiukkaset, PM10


Mittausten ajallinen kattavuus oli 100 %.

Tuntipitoisuuden keskiarvo oli 10,2 µg/m³. Huipputuntipitoisuus oli 30,2 µg/m³.
2. suurin vuorokausiarvo oli 18,9 µg/m³, joka on 27,0 % ohjearvosta (70 µg/m³).


Vuorokausiarvo ei ylittänyt kuun aikana EU:n raja-arvon lukuarvoa (50 µg/m³).

Hengitettävien hiukkasten osalta ilmanlaatuindeksi oli mitatusta ajasta 95,7 % hyvä ja 4,3 % tyydyttävä.





Kuva 1. Hengitettävien hiukkasten tuntipitoisuus heinäkuussa 2026.




Kuva 2. Hengitettävien hiukkasten vuorokausipitoisuus heinäkuussa 2026.

Typpidioksidi, NO₂


Mittausten ajallinen kattavuus oli 100 %.

2. suurin vuorokausiarvo oli 6,4 µg/m³, joka on 9,1 % ohjearvosta (70 µg/m³).
Huipputuntipitoisuus oli 17,1 µg/m³. Tuntiohjearvoon verrattava 99 %-pisteen arvo on 12,1 µg/m³, joka on 8,1 % ohjearvosta (150 µg/m³).

Typpidioksidin osalta ilmanlaatuindeksi oli mitatusta ajasta 100 % hyvä.



Kuva 3. Typpidioksidin tuntipitoisuus heinäkuussa 2026.



Kuva 4. Typpidioksidin vuorokausipitoisuus heinäkuussa 2026.

Laatinut/lisätiedot:

Jukka Järvinen
ympäristönsuojelutarkastaja
Seinäjoen kaupunki
jukka.jarvinen@seinajoki.fi

